

Procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 1 unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno Infantili, con profilo di Tecnico della riabilitazione psichiatrica, prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs n. 66/2010, indetta con D.D.G. n. 4006 del 12.10.2020, pubblicato nella G.U. n. 86 – IV Serie Speciale del 03.11.2020.

Adempimenti di cui all'art. 19 del D.lgs n. 33/2013, come modificato dall'art. 18 del D.lgs n. 97/2016

TRACCE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

Il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 7,30 presso il Dipartimento di Architettura e Design ha luogo la seconda riunione della Commissione esaminatrice della procedura di cui al titolo per lo svolgimento della prima prova scritta.

La Commissione al completo, poiché sono stati stabiliti due turni per le prove scritte e per dare la possibilità ad ogni turno di scegliere tra tre buste, dopo ampia discussione, stabilisce, a norma dell'art. 12, comma 6 del "Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo" di questo Ateneo, le quattro tracce che vengono scritte su tre distinti fogli e denominate: "1", "2", "3" e "4", e immediatamente chiuse in 4 distinte buste sigillate che sono firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal Segretario e determina di assegnare il tempo di 1 ora per lo svolgimento della prova.

TRACCIA n. 1

- 1) La cognitive remediation si differenzia dagli altri training cognitivi perché:
 - ✓ Il suo scopo è insegnare al paziente l'uso di abilità non sviluppate correttamente
 - ✓ Il suo scopo è quello di ripristinare funzioni acquisite e successivamente compromesse
 - ✓ Il suo scopo è lavorare prevalentemente sull'immagine corporea
 - ✓ È un trattamento manualizzato fondato sul recupero di deficit cognitivi tramite abilità sociali
- 2) Uno dei maggiori pionieri nell'utilizzo del role-playing può essere considerato:
 - ✓ Eleanor Clarke Slagle intorno al 1940
 - ✓ Andrew Salter intorno al 1950
 - ✓ George Brown intorno al 1960
 - ✓ Henri Laborit intorno al 1970
- 3) Il modeling è:
 - ✓ Uno strumento per insegnare i comportamenti sociali
 - ✓ Uno strumento che potenzia prevalentemente le velocità di elaborazione e comunicazione non verbale
 - ✓ Uno strumento che sfrutta l'osservazione allo scopo di potenziare i sentimenti di scarsa autostima e autosvalutazione
 - ✓ Uno strumento teso a insegnare la gestione della rabbia
- 4) Tra i modelli psicoeducativi, quello di Colom e Vieta si focalizza prevalentemente su:
 - ✓ Pazienti con diagnosi di Schizofrenia paranoidea
 - ✓ Pazienti con diagnosi di Disturbo Schizoaffettivo
 - ✓ Pazienti con diagnosi di Disturbi di Personalità del Cluster B
 - ✓ Pazienti con diagnosi di Disturbo Bipolare
- 5) Il *Life Goals Program* (LGP) consiste in:

- ✓ una sola fase (12 settimane) dedicata esclusivamente al training
- ✓ una sola fase (6 settimane) a gruppi di 10-15 soggetti
- ✓ tre fasi, la prima (3 settimane) a gruppi di 6-8 soggetti, la seconda (3 settimane) dedicata alla stimolazione cognitiva, la terza (3 settimane) dedicata al training
- ✓ due fasi, la prima (6 settimane) a gruppi di 6-8 soggetti interattiva e la seconda (3 settimane) dedicata al training

6) Nel programma psicoeducativo proposto da John Gunder Gunderson su soggetti affetti da Disturbo Borderline di personalità sono previste:

- ✓ 8 sessioni a cadenza bisettimanale della durata di 90 minuti
- ✓ 12 sessioni a cadenza bisettimanale della durata di 90 minuti
- ✓ 6 sessioni a cadenza settimanale della durata di 90 minuti
- ✓ 15 sessioni a cadenza mensile della durata di 90 minuti

7) L'emotività espressa è definita dalla presenza delle seguenti caratteristiche:

- ✓ Impulsività, ipercoinvolgimento emotivo, nevroticismo
- ✓ Irritabilità, ipercoinvolgimento, nevroticismo
- ✓ Ostilità, ipercoinvolgimento emotivo, commenti critici
- ✓ Aggressività eterodiretta, commenti critici, depressione

8) Quale, tra i seguenti strumenti psicometrici, non è utile per esplorare il carico familiare nei disturbi mentali gravi:

- ✓ Involvement Evaluation Questionnaire (IEQ)
- ✓ Morningness-Eveningness Questionnaire, versione auto-somministrata (MEQ-SA)
- ✓ Perceived Family Burden Scale (PFBS)
- ✓ Nottingham health Profile (NHP)

9) Il test Tower of London (ToL) è stato ideato per:

- ✓ misurare le capacità di mettere in atto processi di decisione strategica e di pianificare soluzioni efficaci tese alla risoluzione di un compito
- ✓ misurare le capacità attentive e visuospatiali
- ✓ misurare le capacità mnemoniche a lungo termine e la capacità di astrazione
- ✓ misurare la capacità di astrazione e le funzioni visuospatiali

10) Quale tra le seguenti affermazioni è la più corretta:

- ✓ Il Wisconsin Card Sorting Test è una prova per esaminare le funzioni temporali del paziente
- ✓ Il Wisconsin Card Sorting Test è una prova per esaminare le funzioni frontali del paziente
- ✓ Il Wisconsin Card Sorting Test è una prova per esaminare le funzioni temporo-mesiali del paziente
- ✓ Il Wisconsin Card Sorting Test è una prova per esaminare le funzioni cerebellari del paziente

11) In base alle linee guida NICE, la CBT-BN costituisce il trattamento di prima scelta con livello di evidenza "A" per il trattamento di:

- ✓ Disturbo da Attacchi di Panico e Binge Eating Disorder in comorbidità
- ✓ Disturbo d'Ansia Generalizzata e Anoressia Nervosa in comorbidità
- ✓ Disturbo Ossessivo-Compulsivo e Disturbo dell'Alimentazione Incontrollata in comorbidità
- ✓ Bulimia nervosa

12) Quale, tra i seguenti strumenti psicometrici, non è specifico nella rilevazione del rischio suicidario:

- ✓ Columbia-Suicide Severity Rating Scale (CSSRS)
- ✓ Beck Hopelessness Scale (BHS)

- ✓ Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)
 - ✓ Reasons for Living Inventory (RFL)
- 13) 106) Quale tra i seguenti domini non viene solitamente indagato dal CogPACK?:
- ✓ concentrazione
 - ✓ memoria
 - ✓ logica e capacità di calcolo
 - ✓ Abilità sociale e comunicazione
- 14) I sintomi negativi nella schizofrenia non sono secondari a:
- ✓ Ai sintomi positivi
 - ✓ Al trattamento con neurolettici
 - ✓ Alla ipostimolazione ambientale
 - ✓ Alla riduzione delle capacità di insight
- 15) La stepped care 2.0 si propone:
- ✓ diversificare la tipologia di assistenza da fornire sulla base dei bisogni rilevati
 - ✓ diversificare la tipologia di assistenza ospedaliera da fornire sulla base dell'età del paziente
 - ✓ diversificare la tipologia di assistenza ambulatoriale da fornire sulla base della riserva cognitiva del paziente
 - ✓ diversificare la tipologia di assistenza domiciliare da fornire sulla base del sesso del paziente
- 16) Il progetto QualyOP:
- ✓ è stato un progetto d'intervento inerente l'istituzione delle prime Case di Cure Psichiatriche su territorio nazionale
 - ✓ è stato un progetto d'intervento inerente l'istituzione delle prime Strutture Residenziali e semi-Residenziali su territorio nazionale
 - ✓ è stato un monitoraggio qualitativo prospettico del processo di chiusura degli Ospedali Psichiatrici
 - ✓ è stato un progetto d'intervento inerente la creazione dei primi servizi psichiatrici nelle strutture carcerarie su territorio nazionale
- 17) Il progetto PROGRESS in ambito psichiatrico è il primo esempio di:
- ✓ ricerca descrittiva e valutativa delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici
 - ✓ ricerca descrittiva e valutativa dei Corsi di Laurea in tecnica della Riabilitazione Psichiatrica su territorio nazionale
 - ✓ ricerca descrittiva e valutativa delle strutture assistenziali territoriali dopo la riforma psichiatrica
 - ✓ ricerca descrittiva e valutativa dei Centri Unità Valutativa Alzheimer (UVA) e dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDGD) su territorio nazionale
- 18) Il progetto MoDiOPG non ha dimostrato:
- ✓ la necessità di un monitoraggio capillare delle dimissioni dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario
 - ✓ Una realtà clinica problematica caratterizzata da soggetti con bisogni complessi
 - ✓ La necessità di attuare percorsi di presa in carico di stampo prevalentemente custodialistico
 - ✓ La necessità di rispondere a bisogni di cura, alloggiativi, riabilitativi risocializzanti
- 19) Il Modello a Matrice, proposto per la pianificazione e realizzazione di obiettivi nei servizi di salute mentale:

- ✓ prevede per la maggior parte la dimensione temporale contrassegnata dal livello internazionale, regionale e comunale
- ✓ prevede per la maggior parte la dimensione geografica contrassegnata dal livello nazionale, provinciale e comunale
- ✓ si articola prevalentemente al livello regionale, provinciale e comunale
- ✓ prevede sia la dimensione geografica e temporale contrassegnate dal livello nazionale/regionale, locale e individuale

20) Quali, tra le seguenti variabili, non sono da considerarsi nel modello comportamentale dell'accesso ai servizi sanitari proposto da Nancy Coover Andreasen nel 1995?

- ✓ Variabili demografiche
- ✓ Valutazione dei bisogni dei pazienti
- ✓ Fattori inerenti convinzioni sulla salute
- ✓ Fattori emotivamente significativi dell'infanzia

21) Il delirio della schizofrenia è:

- ✓ lucido e scarsamente strutturato
- ✓ lucido e ben strutturato
- ✓ confuso e scarsamente strutturato
- ✓ confuso e ben strutturato

22) Il Ministero della Salute definisce "eventi sentinella" in ambito sanitario:

- ✓ eventi avversi di moderata gravità che causano comunemente danni non gravi al paziente
- ✓ eventi avversi di particolare gravità, che causano decesso o gravi danni al paziente
- ✓ eventi che possono essere gestiti dall'Ordine dei Medici
- ✓ eventi che possono essere gestiti dall'Enpam

23) Il diagramma a stella (STAR) consente di comprendere se:

- ✓ se può esistere integrazione tra servizi di salute mentale e servizi socio-assistenziali provinciali
- ✓ una relazione tra i partner di un team multidisciplinare ha le potenzialità per essere generativa nei sistemi di salute territoriali
- ✓ se può esistere integrazione tra servizi di salute mentale e servizi amministrativi territoriali comunali
- ✓ se può esistere integrazione tra servizi di salute mentale e amministrazione penitenziaria a livello nazionale

24) Quale, tra i seguenti, non rappresenta un disturbo del contenuto del pensiero?:

- idea prevalente
- idea ossessiva
- idea delirante
- idea incoerente

25) Il DPR 10 Novembre 1999:

- ✓ definisce il Progetto Obiettivo Nazionale per la tutela della Salute Mentale e costituisce servizi omogenei in Italia
- ✓ istituisce le Aziende sanitarie e Ospedaliere
- ✓ definisce Percorsi Integrati Sociosanitari e Piani di Zona
- ✓ Istituisce i Dipartimenti di salute Mentale (DSM) su territorio nazionale

26) Il modello definito *Health Belief Model* (HBM) è:

- ✓ un programma teso a identificare i soggetti ultra high risk (UHR)
- ✓ una modalità d'intervento integrata all'interno della psicoeducazione di Colom e Vieta
- ✓ un programma che permette di prevedere l'aderenza al trattamento
- ✓ un programma riabilitativo che viene attuato prevalentemente con soggetti affetti da uso di sostanze

27) Quale delle seguenti affermazioni è la più corretta?

- ✓ la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) non è preferibile nei casi di scarsa aderenza al trattamento nella schizofrenia
- ✓ il *counseling* e la psicoterapia supportiva non sono interventi di prima scelta nella schizofrenia
- ✓ I trattamenti più brevi di CBT sono solitamente più efficaci di quelli di più lunga durata nella schizofrenia
- ✓ nella schizofrenia spesso è consigliabile somministrare farmaci ad insaputa del paziente

28) I Corsi di formazione relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro solitamente non devono:

- ✓ essere svolti all'atto dell'assunzione del dipendente
- ✓ essere ripetuti qualora dovessero modificarsi le mansioni di lavoro
- ✓ essere rinnovati ogni sei mesi
- ✓ essere ripetuti se si modificano i processi produttivi

29) I trattamenti psicosociali per la schizofrenia comprendono:

- ✓ Gruppi G. Andrews
- ✓ Social Skills Training
- ✓ Terapia psicodinamica breve
- ✓ Light therapy

30) Quale, tra i seguenti, non rappresenta un deliroide descritto in ambito psicopatologico?:

- ✓ deliroide affettivo
- ✓ deliroide psicosensoriale
- ✓ deliroide caratterogeno
- ✓ deliroide anancastico

TRACCIA n. 2

1) L'utilizzo del modello frazionato di deficit esecutivo nella schizofrenia non prevede:

- ✓ il planning
- ✓ il problem solving
- ✓ il set shifting
- ✓ il concretismo

2) Le strategie utilizzate nella Cognitive Remediation Therapy (CRT) sono di matrice:

- ✓ psicodinamica
- ✓ sistemico-relazionale
- ✓ cognitivo-comportamentale
- ✓ fenomenologica

3) Quale tra i seguenti scopi non si prefigge il Family Focused Treatment:

- ✓ assessment
- ✓ informazione
- ✓ miglioramento delle strategie comunicative
- ✓ incremento delle capacità visuospaziali

4) Il *Bellevue Hospital Center* di New York, uno degli ospedali più antichi degli Stati Uniti d'America, propone un approccio integrato all'avanguardia di trattamenti combinati di gruppi di auto-aiuto per:

- ✓ i Disturbi del comportamento alimentare associato a trattamenti psicofarmacologici intensivi per l'Anoressia Nervosa
- ✓ i Disturbo d'Ansia associati a trattamenti psicosociali intensivi per il Binge Eating Disorder
- ✓ il Disturbo Ossessivo-Compulsivo associato a trattamenti family focused per i disturbi di personalità
- ✓ il Disturbo da Uso di Sostanze associato a trattamenti intensivi per disturbi psichiatrici

5) Quale tra i seguenti non rappresenta un elemento critico sul quale strutturare un intervento riabilitativo in pazienti affetti da disturbo di personalità:

- ✓ Gestione delle fasi di crisi
- ✓ Collegamento con servizi dedicati al trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA)
- ✓ Collegamento con servizi dedicati al trattamento dei disturbi da uso di sostanze
- ✓ Parziale efficacia dei trattamenti psicofarmacologici

6) Il Disturbo da uso di sostanze non è comunemente in comorbidità con:

- ✓ Disturbi dell'umore
- ✓ Disturbi d'Ansia
- ✓ Disturbi di Personalità
- ✓ Mild Cognitive Impairment (MCI)

7) L'utilizzo delle terapie *off-label* è regolamentato dalla:

- ✓ legge n. 65 dd 21 Dicembre 2001 (art. 8)
- ✓ legge n. 13 dd 21 Maggio 1992 (art. 11)
- ✓ legge n. 21 dd 29 Giugno 2014 (art. 11)
- ✓ legge n. 94 dd 8 Aprile 1998 (art. 3)

8) Quale tra i seguenti non rappresenta una valida strategia per favorire l'aderenza agli antipsicotici:

- ✓ concordare con il paziente sulla scelta del farmaco e i risultati desiderati
- ✓ monitoraggio attento e continuo degli effetti collaterali
- ✓ utilizzo di scale di valutazione per monitorare il comportamento antisociale del paziente
- ✓ terapia long-acting

9) Il programma Helping Older People Experience Success (HOPES) comprende:

- ✓ due anni di training per insegnare abilità di vita sociale combinata con Assertive Community Treatment (ACT)
- ✓ un anno di training per insegnare abilità di vita sociale combinata con case management (CM) infermieristico
- ✓ 18 mesi di training per insegnare abilità di vita sociale combinata con case management (CM) infermieristico
- ✓ 6 mesi di training per insegnare abilità di vita sociale combinata con Assertive Community Treatment (ACT)

10) L'intervento psicoeducativo familiare di I. Falloon (1988) si compone di:

- ✓ 4 fasi
- ✓ 5 fasi
- ✓ 6 fasi
- ✓ 8 fasi

- 11) Quale tra le seguenti affermazioni è la più corretta?
- ✓ i sintomi positivi nella schizofrenia sono legati a iperattività del sistema mesolimbico
 - ✓ i sintomi positivi nella schizofrenia sono legati a ipoattività del sistema mesolimbico
 - ✓ i sintomi negativi nella schizofrenia sono legati a ipoattività del sistema mesolimbico
 - ✓ i sintomi negativi nella schizofrenia sono legati a iperattività del sistema mesolimbico
- 12) Nello studio di De Haan e colleghi (2003) che ha incluso un follow-up di 6 anni e che ha esaminato la relazione tra durata della psicosi non trattata e trattamento psicosociale intensivo:
- ✓ l'utilizzo di farmaci psicoattivi correla con l'outcome
 - ✓ il ritardo nella somministrazione di trattamenti psicosociali intensivi (DIPT) correla con l'outcome
 - ✓ Alcuni trattamenti assertivi come il Case Management (CM) correlano con l'outcome
 - ✓ La personalità premorboza di tipo schizoide correla con l'outcome
- 13) Storicamente la dizione "funzioni esecutive" indica:
- ✓ le abilità visuospatiali della corteccia temporo-parietale
 - ✓ le funzioni visive della corteccia occipitale
 - ✓ le funzioni cognitive di ordine elevato della corteccia prefrontale
 - ✓ le funzioni affettive dell'area limbica
- 14) Quali tra i seguenti non rappresenta un esempio di aree tematiche per i programmi di Social Skills Training:
- ✓ Abilità basilari di conversazione
 - ✓ Relazioni sociali e affettive
 - ✓ Abilità per la vita quotidiana
 - ✓ Ascolto attivo di se stessi
- 15) Il task intradimensionale/extradimensionale (ID/ED) della Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) misura:
- ✓ le capacità di astrazione
 - ✓ la gravità delle ossessioni e delle compulsioni e la compromissione psicosociale
 - ✓ l'entità della pseudologia fantastica
 - ✓ la flessibilità cognitiva
- 16) La Terapia Psicologica Integrata (IPT) è un trattamento per la riabilitazione del:
- ✓ paziente con disturbi d'ansia
 - ✓ paziente con obesità psicogena
 - ✓ paziente con disturbi pervasivi dello sviluppo
 - ✓ paziente schizofrenico
- 17) Le misure per assicurare la sicurezza sul lavoro solitamente non prevedono:
- ✓ una formazione adeguata per i dirigenti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori
 - ✓ sostituzione di eventuali oggetti pericolosi con oggetti meno pericolosi
 - ✓ la discrezionalità nel fornire i dispositivi di protezione ai lavoratori
 - ✓ l'obbligatorietà di un'azione di prevenzione volta a fornire ai lavoratori la conoscenza dei loro diritti
- 18) La Cognitive Adaptation Therapy implica:
- ✓ un'analisi della rete sociale adattiva del soggetto
 - ✓ una valutazione globale dell'analisi delle performance cognitive
 - ✓ una valutazione globale delle capacità affettive del soggetto
 - ✓ un'analisi dei punti di debolezza nella famiglia d'appartenenza del soggetto

- 19) Il training della Cognitive Remediation Therapy (CRT):
- ✓ ha una durata complessiva di circa 20 incontri della durata di 20-30 minuti ciascuno
 - ✓ ha una durata complessiva di circa 50 incontri della durata di 10-20 minuti ciascuno
 - ✓ non ha una durata specifica, né un numero di incontri con durata prestabilita
 - ✓ ha solitamente una durata complessiva di circa 40 incontri della durata di 60 minuti ciascuno
- 20) Quale, tra le seguenti affermazioni, è la più corretta?:
- ✓ nel Disturbo Delirante si può apprezzare il fenomeno del *doppio binario*
 - ✓ nel Disturbo Delirante si può apprezzare la pseudologia fantastica
 - ✓ il delirio della schizofrenia è lucido e poco sistematizzato
 - ✓ il delirio della schizofrenia è confuso e poco sistematizzato
- 21) La Terapia Psicologica Integrata (IPT) è un trattamento riabilitativo:
- ✓ della durata di 6 mesi circa con 2-4 incontri di 60-90 minuti
 - ✓ della durata di 12 mesi circa con 4-8 incontri di 30-60 minuti
 - ✓ della durata di 18 mesi circa con 8-12 incontri di 30-40 minuti
 - ✓ della durata di 24 mesi circa con 12-16 incontri di 10-20 minuti
- 22) La Cognitive Enhancement Training (CET) si pone come obiettivo:
- ✓ il ripristino dei deficit mnemonici geneticamente trasmessi
 - ✓ il ripristino dei deficit cognitivi di tipo sociale
 - ✓ il ripristino dei deficit mnemonici risalenti all'età infantile
 - ✓ il ripristino della fluenza verbale e semantica
- 23) Il Neurocognitive Enhancement Training (NET):
- ✓ è un programma di 20 settimane che prevede soltanto esercizi cognitivi
 - ✓ è un programma di 36 settimane che prevede soltanto una fase gruppale sulle competenze sociali
 - ✓ è un programma bifasico di 26 settimane che prevede esercizi cognitivi seguiti da una fase gruppale sulle competenze sociali
 - ✓ è un programma bifasico di 15 settimane che prevede esercizi cognitivi seguiti da una fase facoltativa di tipo gruppale sulle competenze sociali
- 24) Il Neuropsychological educational Approach to Cognitive Remediation (NEAR) è stato inizialmente modulato:
- ✓ dalle teorie psicodinamiche intorno al 1970
 - ✓ dalle teorie fenomenologiche già all'inizio del '900
 - ✓ dalle teorie neurobiologiche alla fine del 1990
 - ✓ dalla psicologia dell'educazione intorno al 2010
- 25) Quale tra i seguenti software non è solitamente dedicato alla riabilitazione neuropsicologica?:
- ✓ COGREHAB
 - ✓ REHACOM COGNIPLUS
 - ✓ COGPACK
 - ✓ PRONIA
- 26) Nel Neuropsychological educational Approach to Cognitive Remediation (NEAR), le sedute sono:
- ✓ solitamente gruppali (gruppi di 10-15 pazienti) con training che non si avvale dell'uso del computer
 - ✓ solitamente con un unico paziente senza promuovere aspetti motivazionali

- ✓ solitamente gruppali (gruppi di 6-8 pazienti) con stimolazione contestualizzata simile alla trama di un film
- ✓ solitamente a gruppi estesi (gruppi con più di 15 pazienti) con training non computerizzato

27) Il CogPACK è:

- ✓ un software operatore dipendente il cui pannello generale presenta 24 esercizi inerenti aspetti motivazionali
- ✓ un software operatore dipendente il cui pannello specifico presenta 44 esercizi inerenti aspetti motivazionali
- ✓ un software relativamente poco autonomo che non permette di disporre di informazioni anagrafiche e farmacologiche sull'utente
- ✓ un software associato ad autonomia dell'utente il cui pannello generale presenta 64 esercizi di training cognitivo

28) Quale, tra i seguenti, non rappresenta un disturbo della Coscienza dell'Io?:

- depersonalizzazione autopsichica
- depersonalizzazione somatopsichica
- depersonalizzazione allopsichica
- delirio di rapporto sensitivo

29) La Cognitive Remediation Therapy (CRT) fonda le sue radici teoriche sul legame tra:

- ✓ affettività e memoria di lavoro
- ✓ performance cognitive e funzionamento sociale
- ✓ capacità di problem solving e cronicità del disturbo psichiatrico dal quale è affetto l'individuo
- ✓ capacità di decision-making e ambiente familiare

30) Relativamente alla figura del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori:

- ✓ deve essere designato in ogni luogo di lavoro ad eccezione delle aziende ospedaliere. Nelle unità produttive con meno di 50 dipendenti sono almeno 2 le figure, in quelle tra 201 e 1000 dipendenti devono essere almeno 5
- ✓ deve essere designato in ogni luogo di lavoro ad eccezione delle ASL territoriali. Nelle unità produttive con meno di 50 dipendenti sono almeno 2 le figure, in quelle oltre i 1000 dipendenti devono essere almeno 8
- ✓ deve essere designato in ogni luogo di lavoro a livello provinciale. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti sono almeno 2 le figure, in quelle con più di 1000 dipendenti devono essere almeno 5
- ✓ deve essere designato in ogni luogo di lavoro. Nelle unità produttive con numero di dipendenti tra 201 e 1000 sono almeno 3 le figure, in quelle con più di 1000 dipendenti devono essere almeno 6

TRACCIA n 3

1) Il pacchetto completo di erogazione della Cognitive Enhancement Training (CET) prevede:

- ✓ 90 ore di training neurocognitivo con l'utilizzo del software Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB)
- ✓ 120 ore di training neurocognitivo senza l'utilizzo di alcun software
- ✓ 60 ore di training neurocognitivo con l'utilizzo del software PSS - CogReHab
- ✓ 150 ore di training neurocognitivo senza l'utilizzo di alcun software

2) L'apprendimento di tipo dicotico nei training di stimolazione cognitiva prevede:

- ✓ l'ascolto di un numero variabile di segmenti di storie sulle quali viene attribuito uno scoring alle risposte errate
- ✓ l'ascolto di un numero variabile di segmenti di poesie sulle quali viene attribuito uno scoring alle risposte errate
- ✓ l'ascolto di 8 segmenti di storie alle quali prestare attenzione mentre viene trasmesso un elemento distrattore che bisogna ignorare
- ✓ l'ascolto di 16 segmenti di storie alle quali prestare attenzione senza lavorare su aspetti motivazionali

3) Quali, tra le seguenti aree, non migliora più nettamente con l'ausilio della Cognitive Remediation?

- ✓ Memoria verbale
- ✓ Velocità di processamento
- ✓ Funzioni esecutive
- ✓ Quoziente intellettivo

4) Il programma *Thinking Skills for Work* solitamente non si associa a:

- ✓ sviluppo di strategie compensatorie in ambito lavorativo
- ✓ miglioramento dell'autostima
- ✓ riduzione della sintomatologia depressiva
- ✓ miglioramento della capacità di linguaggio

5) La *Functional Adaptation Skills Training* (FAST) si associa a:

- ✓ miglioramento delle competenze sociali
- ✓ miglioramento in termini di remission
- ✓ miglioramento della duration of untreated illness (DUI)
- ✓ miglioramento dei comportamenti antisociali

6) La Brief Cognitive Assessment Tool for Schizofrenia (B-CATS) è:

- ✓ un test che consente di valutare il livello cognitivo dei pazienti con disturbo schizoaffettivo in circa 30 minuti
- ✓ un test che consente di valutare il livello cognitivo dei pazienti sia con schizofrenia che con disturbo schizoaffettivo in tempi analoghi alla MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB)
- ✓ un test che consente di valutare il livello cognitivo dei pazienti con schizofrenia in circa 10 minuti
- ✓ un test che consente di valutare il livello cognitivo e psicosociale dei pazienti con disturbo schizoaffettivo che può essere somministrato soltanto da psicometrismi

7) La Dinamica del Triangolo Perverso è stata formulata:

- ✓ da Henry B. Richardson nel 1945
- ✓ da Jay Haley nel 1985
- ✓ da Don D. Jackson nel 1997
- ✓ da Gregory Bateson nel 1999

8) Quali, tra le seguenti caratteristiche, non sono contemplate nell'approccio psicoeducativo?:

- ✓ il planning strategico
- ✓ la personalizzazione dell'informazione
- ✓ l'esposizione delle informazioni circa la malattia
- ✓ stimolazione cognitiva

9) Il *Barcelona model*:

- ✓ è dedicato a pazienti in fase di eutimia e prevede 21 sessioni settimanali della durata di 90 minuti
- ✓ è dedicato a pazienti in fase depressiva e prevede 9 sessioni settimanali della durata di 60 minuti
- ✓ è dedicato a pazienti in fase ipomaniacale e prevede 18 sessioni settimanali della durata di 60 minuti
- ✓ è dedicato a pazienti schizofrenici e prevede 28 sessioni settimanali della durata di 90 minuti

10) Il *Life Goals Program* (LGP):

- ✓ è un gruppo psicoeducazionale non strutturato per pazienti con disturbo schizoaffettivo
- ✓ è un gruppo psicoeducazionale strutturato e manualizzato per pazienti con disturbi d'Ansia
- ✓ è un gruppo psicoeducazionale strutturato e manualizzato per pazienti con Disturbi da Uso di Sostanze
- ✓ è un gruppo psicoeducazionale strutturato e supportato da manuale specifico per pazienti con disturbo bipolare

11) Le sedute della Terapia Interpersonale e dei Ritmi Sociali (IPSRT):

- ✓ hanno una durata variabile dai 45 ai 55 minuti e sono condotte da terapisti esperti
- ✓ hanno una durata variabile dai 35 ai 45 minuti e sono condotte da tecnici della riabilitazione psichiatrica
- ✓ hanno una durata variabile dai 60 ai 70 minuti e sono condotte prevalentemente da psicologi
- ✓ hanno una durata variabile dai 70 agli 80 minuti e sono condotte prevalentemente da psicometri

12) Nel modello multifamiliare per il Disturbo Bipolare di Ian Falloon (1997), quanti sono i moduli previsti per il trattamento?

- ✓ 12
- ✓ 6
- ✓ 8
- ✓ 9

13) L'Intensive Clinical Management è:

- ✓ un approccio guidato da un manuale specifico e sviluppato seguendo le strategie di management del Disturbi da discontrollo degli impulsi
- ✓ un approccio guidato da un manuale specifico e sviluppato seguendo le strategie di management dei Disturbi d'Ansia
- ✓ un approccio guidato da un manuale specifico e sviluppato seguendo le strategie di management del Disturbo Bipolare
- ✓ un approccio guidato da un manuale specifico e sviluppato seguendo le strategie di management della Schizofrenia

14) Il *Coping Strategy Enhancement* (CSE) è:

- ✓ una tecnica psicosociale che coniuga la fenomenologia con elementi di tipo cognitivo-comportamentale
- ✓ una tecnica psicosociale che coniuga la psicoeducazione con elementi di tipo psicodinamico
- ✓ una tecnica psicosociale che coniuga la psicoeducazione con elementi di tipo sistemico-relazionale
- ✓ una tecnica psicosociale che coniuga la psicoeducazione con elementi di tipo cognitivo-comportamentale

15) Il *Trattamento Psicologico Integrato* (IPT) è un intervento riabilitativo rivolto:

- ✓ ai deficit cognitivi e delle competenze sociali in pazienti affetti da schizofrenia e disturbi dello spettro schizofrenico
- ✓ prevalentemente ai deficit cognitivi in pazienti con disturbi unipolari dell'umore
- ✓ prevalentemente ai deficit cognitivi in pazienti con disturbi bipolari dell'umore
- ✓ a promuovere le capacità di mentalizzazione in pazienti con Disturbi d'Ansia

16) Quale, tra i seguenti, non rappresenta un approccio psicoeducativo familiare?:

- ✓ intervento cognitivo basato sui bisogni dei familiari
- ✓ intervento di problem solving sviluppato da I. Falloon
- ✓ approccio comportamentale di R. Lieberman
- ✓ approccio Psicologico relazionale di Alfred Adler

17) L'*Iowa Gambling Task* valuta:

- ✓ la memoria a breve termine
- ✓ i domini attentivi
- ✓ le funzioni esecutive
- ✓ i meccanismi decisionali

18) L'approccio *Family Focused Therapy* (FFT) si rivolge a:

- ✓ pazienti con disturbo antisociale e familiari
- ✓ solo ai familiari di pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo
- ✓ pazienti bipolari sia ospedalizzati che ambulatoriali e familiari
- ✓ pazienti schizofrenici ospedalizzati e familiari

19) L'intervento psicoeducativo familiare di I. Falloon (1988) prevede:

- ✓ 10-12 incontri settimanali con durata media di 60-90 minuti
- ✓ 15-20 incontri settimanali con durata media di 20-30 minuti
- ✓ 20-30 incontri settimanali con durata media di 40-50 minuti
- ✓ Più di 30 incontri settimanali con durata media di oltre 90 minuti

20) Il *Multifamily Behavioral Treatment* (MFBT) è stato sviluppato per il trattamento integrato:

- ✓ del Disturbo d'Ansia generalizzato
- ✓ delle Fobie sociali e Specifiche
- ✓ del Disturbo da Attacchi di Panico con agorafobia
- ✓ del Disturbo Ossessivo-Compulsivo

21) L'intervento sviluppato da W. McFarlane è stato adattato alle famiglie dei pazienti con:

- ✓ disturbo antisociale di personalità
- ✓ disturbo narcisistico di personalità
- ✓ disturbo borderline di personalità
- ✓ disturbo dipendente di personalità

22) Il *counselling* familiare è un approccio individuale:

- ✓ che prevede 8-10 sedute con familiari di pazienti con sintomi prevalentemente attivi e poco responsivi al trattamento
- ✓ che prevede 10-15 sedute con familiari di pazienti con sintomi prevalentemente cognitivi
- ✓ che prevede 10-15 sedute con familiari di pazienti con sintomi prevalentemente disorganizzati
- ✓ che prevede 4-5 sedute con familiari di pazienti con sintomi prevalentemente residui resistenti al trattamento

23) Gli interventi psicoeducativi di supporto sono:

- ✓ interventi a gruppi ristretti condotti con conoscenti di pazienti affetti da Disturbi di Personalità

- ✓ interventi individuali con pazienti affetti da Disturbo Schizoaffettivo
- ✓ interventi di gruppo aperti a familiari e amici di pazienti affetti da Psicosi
- ✓ interventi di gruppo aperti condotti generalmente con conoscenti di pazienti affetti da Disturbi d'Ansia e comorbidità somatiche

24) Le prime clubhouses psicosociali utilizzate per riabilitazione psichiatrica si sono sviluppate:

- ✓ oltre 30 anni fa a Dublino
- ✓ oltre 40 anni fa a Canterbury
- ✓ oltre 50 anni fa a Fountain House
- ✓ oltre 60 anni fa a Norwich

25) Le enclavi di lavoro sono:

- ✓ forme di lavoro realizzate tramite un'agenzia dove un paziente affetto da disturbi psichiatrici è impiegato insieme con altri pazienti psichiatrici
- ✓ forme di lavoro realizzate all'interno di un Centro Diurno dove un paziente affetto da disturbi psichiatrici è impiegato insieme con l'equipe multidisciplinare
- ✓ forme di lavoro realizzate all'interno di una Comunità Terapeutica dove un paziente affetto da disturbi psichiatrici è impiegato insieme con l'equipe multidisciplinare
- ✓ forme di lavoro realizzate all'interno di una Casa famiglia dove un paziente affetto da disturbi psichiatrici è impiegato insieme con l'equipe multidisciplinare

26) Quali, tra i seguenti, non possono essere eliminati, attenuati, controllati grazie alla adeguata sicurezza sui posti di lavoro?:

- ✓ incidenti e infortuni per i lavoratori
- ✓ l'insorgere di malattie professionali
- ✓ fattori di rischio derivanti dai processi lavorativi
- ✓ fattori di rischio derivanti da variabili individuali

27) Nella Sindrome di Cotard:

- ✓ sono descritti deliri di veneficio ed erotomanici, umore ipomaniacale e attitudine alla completa passività
- ✓ sono descritti deliri nichilistici e ipocondriaci drammatici e tinte di grandiosità, umore depresso e attitudine di completa passività
- ✓ sono descritti deliri genealogici e ambiziosi, umore misto e attitudine all'ipearattività
- ✓ sono descritti deliri querulomanici e di litigiosità, umore misto e attitudine all'ipearattività

28) Quale, tra i seguenti, non rappresenta un sintomo fondamentale della Schizofrenia secondo Eugen Bleuler?

- ✓ Dissociazione ideativa
- ✓ Autismo
- ✓ Ambivalenza
- ✓ Delirio di rapporto sensitivo

29) Quali, tra le seguenti, non rappresenta una figura partecipe della sicurezza sul lavoro?

- ✓ Datore di lavoro
- ✓ Preposto per la sicurezza
- ✓ Medico Competente
- ✓ Garante per la protezione dei dati personali

30) I sintomi di base furono inizialmente:

- ✓ identificati da Kraepelin agli inizi del '900

- ✓ identificati da Zilboorg intorno al 1940
- ✓ identificati con la quarta edizione Text Revision (TR) del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV)
- ✓ identificati da Huber in Germania intorno al 1965

TRACCIA n. 4

) Quali, tra le seguenti, non rappresentano motivazioni sottostanti il mancato utilizzo della psicoeducazione nei servizi di salute mentale?:

- ✓ mancanza di risorse
- ✓ terapie psicofarmacologiche
- ✓ mancanza di know-how
- ✓ scetticismo dell'operatore

2) Il Trattamento Psicologico Integrato (IPT) prevede:

- ✓ un training di 9 mesi con setting individuale
- ✓ un training di 12 mesi con setting di gruppo ristretto (2-4 partecipanti)
- ✓ un training di 3 mesi con setting di gruppo (5-7 partecipanti)
- ✓ un training di 6 mesi con setting di gruppo (10-15 partecipanti)

13) Lo studio randomizzato di valutazione dell'Assertive Community Treatment (ACT) nel nord di Londra (REACT) condotto nel 2006 per un periodo di 18 mesi:

- ✓ evidenzia variazioni significative in termini di remissione tra soggetti trattati con ACT e trattamento standard
- ✓ evidenzia variazioni significative in termini di risposta al trattamento tra soggetti trattati con ACT e trattamento standard
- ✓ evidenzia variazioni significative in termini di riospedalizzazione tra soggetti trattati con ACT e trattamento integrato
- ✓ non evidenzia variazioni significative in termini di ospedalizzazione tra soggetti trattati con ACT e trattamento standard

4) Quale tra le seguenti affermazioni è la più corretta?

- ✓ i primi approcci psicoeducativi familiari per il trattamento della Schizofrenia sono stati sviluppati negli anni sessanta
- ✓ i primi approcci psicoeducativi familiari per il trattamento della Schizofrenia sono stati sviluppati negli anni settanta
- ✓ i primi approcci psicoeducativi familiari per il trattamento del Disturbo Bipolare sono stati sviluppati negli anni novanta
- ✓ i primi approcci psicoeducativi familiari per il trattamento della Schizofrenia risalgono a data antecedente il 1950

5) Il Collocamento Individuale e Sostegno (IPS) è un intervento riabilitativo che si colloca nell'ambito:

- ✓ del supported employment
- ✓ del laboratorio protetto
- ✓ del sussidio economico
- ✓ dell'enclave di lavoro

6) Il programma Personal Assessment and Crisis Evaluation (PACE) si è principalmente focalizzato sui:

- ✓ processi di transizione dalla fase pre-psicotica alla psicosi
- ✓ processi di transizione dalla fase del *Mild Cognitive Impairment* (MCI) alla demenza
- ✓ processi di riduzione della disabilità legata al Disturbo Bipolare
- ✓ processi di riduzione della disabilità legata al Disturbo Depressivo Maggiore

7) Il ciclo dell'aggressività comprende le seguenti fasi in ordine:

- ✓ fase del fattore scatenante, fase della crisi, fase dell'escalation, fase della depressione post-critica, fase del recupero
- ✓ fase del fattore scatenante, fase dell'escalation, fase della depressione post-critica, fase del recupero
- ✓ fase del fattore scatenante, fase della crisi, fase dell'escalation, fase del recupero
- ✓ fase del fattore scatenante, fase dell'escalation, fase della crisi, fase del recupero, fase della depressione post-critica

8) L'atteggiamento o posizione SOLER (sit squarely, open posture, lean forward, eye contact, relax) è consigliabile con pazienti:

- ✓ depressi
- ✓ inibiti
- ✓ schizoidi
- ✓ aggressivi

9) L'*Assertive Community Treatment* (ACT):

- ✓ è una modalità di intervento sistemico-relazionale condotto prevalentemente in ambiente ospedaliero
- ✓ è una modalità di intervento psicodinamico condotto prevalentemente in ambiente ambulatoriale
- ✓ è una modalità di intervento sistemico-relazionale condotto prevalentemente in ambiente di day-hospital
- ✓ è una modalità di intervento multidisciplinare che fonde competenze nella strutturazione di servizi necessari per il paziente

10) Quali, tra le seguenti affermazioni, è la più corretta?

- ✓ Il Case Management è una terapia di stampo psicodinamico breve
- ✓ Il Case Management è stato concepito per fornire un coordinamento alle cure in ambito ospedaliero
- ✓ Il Case Management non è una terapia, ma un pacchetto di cure territoriali
- ✓ Il Case Management è stato concepito per fornire un coordinamento alle cure extra-regionali

11) Dai risultati del Cologne Early Recognition Study emergono:

- ✓ un solo gruppo di sintomi di base prevalentemente disorganizzati (COPER)
- ✓ un solo gruppo di sintomi di base prevalentemente positivi (COGDIS)
- ✓ due gruppi di sintomi di base cognitivo-percettivi e ad elevato rischio di transizione (COPER e COGDIS)
- ✓ tre gruppi di sintomi di base cognitivo-percettivi, ad elevato rischio di transizione e brevi intermittenti, limitati (COPER, COGDIS, BLIPS)

12) Il *Lambert Early Onset trial* (LEO) ha valutato in termini di drop-out:

- ✓ l'efficacia a 24 mesi di un servizio specializzato per stati mentali a rischio che applica il modello del supported employment

- ✓ l'efficacia a 12 mesi di un servizio specializzato per stati mentali a rischio che applica il modello delle clubhouses riabilitative
- ✓ l'efficacia a 36 mesi di un servizio specializzato per soggetti con sintomi di base che applica il modello della cognitive remediation
- ✓ l'efficacia a 18 mesi di un servizio specializzato per esordi psicotici che applica il modello dell'Assertive Community Treatment (ACT)

13) Quale tra le seguenti affermazioni non è corretta relativamente alla *Transference Focused Psychotherapy* (TFP):

- ✓ la TFP migliora i tratti schizotipici di personalità
- ✓ la TFP riduce i comportamenti suicidari
- ✓ la TFP migliora i tratti paranoidei di personalità
- ✓ la TFP riduce il tasso di pazienti revolving-door

14) La figura del case manager:

- ✓ generalmente interagisce con il Direttore Generale della struttura ospedaliera
- ✓ generalmente interagisce con il provveditorato
- ✓ generalmente interagisce con la Polizia penitenziaria
- ✓ svolge la sua attività prevalentemente sul territorio

15) La *Schema Focused Therapy* (SFT) concepisce i pazienti con:

- ✓ disturbo borderline di personalità prevalentemente in quattro schemi di vita disfunzionali
- ✓ schizofrenia prevalentemente in due schemi di vita disfunzionali
- ✓ disturbo prevalentemente in tre schemi di vita disfunzionali
- ✓ disturbo ossessivo-compulsivo in cinque schemi di vita disfunzionali

16) La Terapia Cognitivo Analitica:

- ✓ integra aspetti della terapia fenomenologica con elementi della terapia cognitivo-comportamentale
- ✓ integra aspetti delle terapie psicodinamiche con elementi della terapia cognitivo-comportamentale
- ✓ integra aspetti della cognitive remediation con elementi della terapia sistemico-relazionale
- ✓ integra aspetti della terapia cognitivo-comportamentale con elementi del problem-solving

17) Nel lavoro di equipe con i pazienti affetti da disturbo borderline di personalità, il team Dialectical Behavioral Therapy (DBT) si incontra:

- ✓ mensilmente per circa 8 ore con riunioni di tipo non strutturato
- ✓ in modo variabile
- ✓ non sono previste riunioni
- ✓ settimanalmente per circa 4 ore con riunioni di tipo strutturato

18) Quale, tra i seguenti, non rappresenta un elemento chiave dell'*Assertive Community Treatment* (ACT)?:

- ✓ rapporto 1:10 tra operatore e gli utenti
- ✓ servizi non limitati nel tempo
- ✓ interventi specifici opinion-based fondati sull'esperienza dell'operatore
- ✓ assertive outreach Teams integrati in sistemi di salute mentale

19) La Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS):

- ✓ è composta da 30 items ed è indicata principalmente per la valutazione del paziente con schizofrenia

- ✓ è composta da 25 items ed è indicata principalmente per la valutazione del paziente con abuso/dipendenza da sostanze
 - ✓ è composta da 40 items ed è indicata principalmente per la valutazione del paziente con disturbi unipolari dell'umore
 - ✓ è composta da 40 items ed è indicata principalmente per la valutazione del paziente con disturbi bipolari dell'umore
- 20) La Wechsler Adult intelligence Scale (WAIS-R) è particolarmente indicata per l'assessment:
- ✓ delle funzioni cognitive
 - ✓ degli aspetti antisociali
 - ✓ degli aspetti motivazionali
 - ✓ degli stati di agitazione psicomotoria
- 21) La *Symptom Check List-90 Revised* (SCL-90) è adeguata per valutare:
- ✓ il livello generale di psicopatologia
 - ✓ il livello d'ansia di stato e di tratto
 - ✓ la tendenza all'alessitimia
 - ✓ il livello dei sintomi dissociativi
- 22) La *Mentalization Based Therapy* (MBT) è particolarmente indicata in pazienti con:
- ✓ disturbo borderline di personalità
 - ✓ disturbo oppositivo-provocatorio
 - ✓ ADHD
 - ✓ Disturbo Bipolare
- 23) Quale tra le seguenti affermazioni è la più corretta:
- ✓ Nel mettere a punto la Scales for Physical and Social Anhedonia (SPSA), ci si proponeva di verificare l'esistenza o meno di un rapporto tra anedonia e sviluppo di un disturbo alimentare
 - ✓ Nel mettere a punto la Scales for Physical and Social Anhedonia (SPSA), ci si proponeva di verificare l'esistenza o meno di un rapporto tra anedonia e sviluppo di un disturbo schizofrenico
 - ✓ Nel mettere a punto la Scales for Physical and Social Anhedonia (SPSA), ci si proponeva di prendere in considerazione l'anedonia come elemento di stato
 - ✓ La Scales for Physical and Social Anhedonia (SPSA) non comprende un insieme di items di controllo per verificare che i soggetti rispondano in maniera meccanica o acquiescente
- 24) La valutazione delle abilità di inibire la risposta (compiti GO/NO-GO) ha evidenziato come pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo:
- ✓ commettano meno errori dei soggetti di controllo
 - ✓ commettano più errori dei soggetti di controllo
 - ✓ commettano un numero simile di errori rispetto ai soggetti di controllo
 - ✓ non beneficiano di tale valutazione
- 25) Nel team di *Case Management Intensivo* si prevede:
- ✓ un numero di utenti pari a 15, strutturazione di un presidio fisso in comunità, l'elevata intensità degli stimoli offerti
 - ✓ un numero ristretto (inferiore a 10) di utenti, strutturazione di un presidio fisso in comunità, bassa intensità degli stimoli offerti
 - ✓ un numero di utenti allargato (superiore a 30), strutturazione di un presidio fisso in comunità, bassa intensità degli stimoli offerti
 - ✓ un numero di utenti pari a 10, la mobilità in comunità, l'elevata intensità degli stimoli offerti

- 26) Il concetto di empowerment che indica un processo di crescita, è stato sviluppato:
- ✓ negli anni '60 dalla psicologia dell'educazione
 - ✓ negli anni '70 dalla psicologia di comunità
 - ✓ negli anni '80 dalla psicologia dinamica
 - ✓ negli anni '90 con l'avvento del modello stress-diatesi
- 27) Il concetto di: “madre schizofrenogena” è stato coniato:
- ✓ da Fromm-Reichmann nel 1948
 - ✓ da Paul Watzlawick nel 1964
 - ✓ da Milton Erickson nel 1976
 - ✓ da Gregory Bateson nel 1977
- 28) In base ai risultati dell'*European Prediction of Psychosis Study* (EPOS):
- ✓ il rischio di sviluppare psicosi è >10% in caso di sintomi disorganizzati e sintomi di base cognitivi
 - ✓ il rischio di sviluppare psicosi è >20% in caso di sintomi negativi e sintomi di base cognitivo-percettivi
 - ✓ il rischio di sviluppare psicosi è >30% in caso di sintomi positivi e sintomi di base cognitivo-percettivi
 - ✓ il rischio di sviluppare psicosi è >40% in caso di sintomi psicotici attenuati (APS) e sintomi di base cognitivi
- 29) Quali, tra le seguenti, affermazioni è la più corretta:
- ✓ La sicurezza sui luoghi di lavoro è regolamentata dal Testo Unico 11 del 2012, che ha abrogato la precedente legge 108 del 1996
 - ✓ La sicurezza sui luoghi di lavoro è regolamentata dal Testo Unico 50 del 2013, che ha abrogato la precedente legge 523 del 1997
 - ✓ La sicurezza sui luoghi di lavoro è regolamentata dal Testo Unico 37 del 2014, che ha abrogato la precedente legge 232 del 1998
 - ✓ La sicurezza sui luoghi di lavoro è regolamentata dal Testo Unico 81 del 2008, che ha abrogato la precedente legge 626 del 1994
- 30) Quale tra le seguenti affermazioni è la più corretta:
- ✓ Il Biofeedback è una tecnica di autoregolazione psicofisiologica che permette di implementare la stimolazione sensoriale
 - ✓ Diversi studi scientifici hanno ben dimostrato l'efficacia del Biofeedback nel trattamento del Mild Cognitive Impairment
 - ✓ Il Neurofeedback è una tecnica di autoregolazione psicofisiologica che permette di acquisire consapevolezza e controllare più facilmente la propria attività cognitiva
 - ✓ Diversi studi scientifici hanno ben dimostrato l'efficacia del Biofeedback nel trattamento dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo

Nel primo turno è stata estratta la prova indicata con il n. 4
Nel secondo turno è stata estratta la prova indicata con il n. 2

TRACCE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 13,15 presso l'aula informatica de Dipartimento di Architettura e Design ha luogo la terza riunione della Commissione esaminatrice della procedura di cui al titolo per lo svolgimento della seconda prova scritta.

La Commissione al completo, dopo ampia discussione, stabilisce, a norma dell'art. 12, comma 6 del "Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo" di questo Ateneo, le tre tracce allegate:

che vengono scritte su tre distinti fogli e denominate:

"1", "2" e "3", e immediatamente chiuse in tre distinte buste sigillate che sono firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal Segretario e determina di assegnare il tempo di 1 ora per lo svolgimento della prova.

TRACCIA n.1

Si chiede al candidato di impostare di seguito un elaborato inerente la metodologia della ricerca clinica nel caso di un gruppo di 60 pazienti (età 18-65 anni) affetti da Schizofrenia con sintomi prevalentemente negativi, episodio multiplo, attualmente in remissione parziale (DSM-5) in fase di ricovero e trattamento psicofarmacologico con farmaci antipsicotici atipici in ambiente psichiatrico.

- 1) Indichi il candidato le modalità relative alla raccolta dati e all'analisi dei dati clinici;
- 2) Specifichi il candidato le modalità relative alla conduzione di uno studio clinico avente come outcome primario l'esito di un intervento riabilitativo con la tipologia dei pazienti appena menzionati;
- 3) Menzioni il candidato le principali dimensioni psicopatologiche da considerarsi rilevanti in ambito clinico nel campione di pazienti specificato;
- 4) Identifichi il candidato le principali opzioni di intervento in termini di riabilitazione psichiatrica nel breve, medio e lungo periodo nel campione di pazienti specificato;
- 5) Riporti il candidato le ricadute traslazionali più rilevanti in ambito clinico nel campione di pazienti specificato.

TRACCIA n. 2

Si chiede al candidato di impostare di seguito un elaborato inerente la metodologia della ricerca clinica nel caso di un gruppo di 100 pazienti (età 18-65 anni) affetti di un Disturbo Bipolare di tipo II, più recente episodio ipomaniacale, attualmente in remissione parziale (DSM-5) in regime di ricovero e trattamento con farmaci stabilizzanti del tono dell'umore e antidepressivi SSRIs a basso dosaggio in ambiente psichiatrico.

- 1) Indichi il candidato le modalità relative alla raccolta dati e all'analisi dei dati clinici;
- 2) Specifichi il candidato le modalità relative alla conduzione di uno studio avente come outcome primario l'esito di un intervento riabilitativo con la tipologia dei pazienti appena menzionati;
- 3) Menzioni il candidato le principali dimensioni psicopatologiche da considerarsi rilevanti in ambito clinico nel campione di pazienti specificato;

- 4) Identifichi il candidato le principali opzioni di intervento in termini di riabilitazione psichiatrica nel breve, medio e lungo periodo nel campione di pazienti specificato;
- 5) Riporti il candidato le ricadute traslazionali più rilevanti in ambito clinico nel campione di pazienti specificato.

TRACCIA n.3

Si chiede al candidato di impostare di seguito un elaborato inerente la metodologia della ricerca clinica nel caso di un gruppo di 100 pazienti (età 18-65 anni) affetti di un Disturbo Ossessivo-Compulsivo, attualmente in remissione parziale (DSM-5) in regime di trattamento ambulatoriale con farmaci antidepressivi triciclici ad alto dosaggio e benzodiazepine a breve emivita presso il Centro di Salute Mentale d'appartenenza territoriale.

- 1) Indichi il candidato le modalità relative alla raccolta dati e all'analisi dei dati clinici;
- 2) Specifichi il candidato le modalità relative alla conduzione di uno studio clinico avente come outcome primario l'esito di un intervento riabilitativo con la tipologia dei pazienti appena menzionati;
- 3) Menzioni il candidato le principali dimensioni psicopatologiche da considerarsi rilevanti in ambito clinico nel campione di pazienti specificato;
- 4) Identifichi il candidato le principali opzioni di intervento in termini di riabilitazione psichiatrica nel breve, medio e lungo periodo nel campione di pazienti specificato;
- 5) Riporti il candidato le ricadute traslazionali più rilevanti in ambito clinico nel campione di pazienti specificato.

E' stata estratta la prova indicata con il n. 1.

Genova, 13 dicembre

La Commissione

Firmato il Presidente

Firmato il Segretario